
Hullehavn

ID: 1073 · Naturdyk
www.vragguiden.dk/vrag/1073

Position & Dybde



WGS84 · Beregnet WGS84-visning
55:07,867N 15:09,534E

ED50
55:07,90N 15:09,60E

Dybde (top)	Dybde (bund)
30 m	**Ukendt**
Stævnretning	Afstand til kyst
Ukendt	**0,2 km**

Beskrivelse

Kilde:$.Artikel om Bornholm i bladet DYK! nr 7/1996 Ud for Hullehavn ligger også vraget af DEPOSITUM, se denne. Næste morgen er det så af sted i vandet. Vi har valgt en forladt, gammel havn med en lille stenmole, der rager ud fra granitklipperne. Lige i nærheden rager fyrtårnet på Sandkås Odde ved Svaneke op mod himlen - et markant landmærke når man dykker her, specielt hvis man dykker om natten. <stersøens vand er overraskende klart her, sigten under vand er over 20 meter. På runde pukler af granit vokser blæretangen frodigt. Sværme af bittesmå dyr farer gennem det klare vand, dykker ned i tangskovene og dukker så igen op. Denne vilde dans udføres først og fremmest af sværme af rødlige krebsdyr og små rejer. I blære-tangens virvar gemmer der sig også mørkegrønne torsk. Tangnål står i vandet med hovedet nedad, mens de forsigtigt prøver sig frem i algerne. Ind imellem kan man få øje på ulke i tangskovene, der svajer i dønningen, hvorefter de igen dækkes til. De ligefremme "kammerater" med deres stikkende finner rører vi ikke ved. Der hvor strømmen og bølgeslagene er for hårde, har de højere arter af planter, såsom ålgræs, ikke en chance. Men højtudviklede, solide algearter som blære- og savtang kan klare bølgeslagene, og de kan med deres hæfteskiver også klare sig fremragende på en mere hård bund og på klipper. På de forskellige dybder ser vi desuden søsalat, rørhinde, vandknippehår og andre tangarter. Deres farver strækker sig fra næsten at være sorte over brune og rødbrune og til næsten alle grønne nuancer. Rundt om Bornholm har tangen overtaget den rolle, som ålgræsset spiller i den vestlige del af <stersøen. Tang kan bedre tåle det stærkt varierende indhold af salt i den midterste del af <stersøen end de andre marine planter, og de udfylder på samme tid flere funktioner i de omgivelser, som de befinder sig i: De egner sig fint til gemmested for fisk, som legested og børneværelse for mange dyrearter, og de er næringskilde for mange snegle og for den almindelige tanglus. Vi dykker videre og er endnu ikke mætte af indtrykkene, Granitvægge danner små canyons, kæmpestore skandinaviske vandreblokke danner strækninger som af rullesten, og disse skråninger fører os igen og igen længere ned i dybet. Hurtigt når vi ud for Hullehavn ned på 30 meters dybde. I det klare <stersøvand klarer blæretangen at

kunne leve ned til en dybde på omkring otte meter. Der, hvor lyset er for svagt til, at der kan gro alger, begynder zonen med blåmuslinge- banker. Jo større dybde man er på, jo mindre og jo mørkere er muslingerne. På disse rigt strukturerede muslingebanker lever der først og fremmest sort kutling. På vej mod overfladen opdager vi store torsk i rullestensskænternes hulrum. Næsten een meter lange torsk står der her godt beskyttet af klippestykkerne, og de kommer først ud, når det bliver mørkt. Næsten ved slutningen af dykket spejder en farvestrålende stenbider ud på os fra blæretangen. Den bruger vi de sidste billeder af filmen på. (c)Rettet den 08/10-1996. ANDERS CLAUSEN

Sidst rettet af: DykInfo Dato: Ukendt